



1963. *Graellsia*, 20(1-3): 1-20



ALGUNOS LEPIDÓPTEROS DE PUNTA UMBRÍA,
PROVINCIA DE HUELVA.

LA CANARIA *EILEMA ALBICOSTA* (GHER., 1894)
NUEVA PARA ESPAÑA Y EUROPA.

(LEPIDOPTERA)

por

R. AGENJO

(Lám. 1)

La faunula lepidopterológica andaluza está relativamente bien conocida por lo que respecta a varias de sus provincias como Granada, Málaga, Cádiz y Almería, si bien la de ésta sólo en modo parcial, aunque más completo para ciertos meses. Jaén, Córdoba, Sevilla y, sobre todo, Huelva, carecen todavía de buenos estudios acerca de sus territorios. Con relación a la última, de la que apenas existían datos hasta hace pocos años, deseé siempre explorar algunas de sus comarcas más prometedoras al objeto de completar en lo posible muchas de las fichas específicas de distribución geográfica en España, pero hasta ahora no he logrado ver cumplido mi anhelo.

Hace unos diez años, don Pablo Lammers me puso en relación con el señor Adolfo Clauss, poseedor de una, a lo que creo, bonita y bastante completa colección de lepidópteros onubenses. Por desgracia,

15. *USTOCIDALIA MARGINEPUNCTATA* (Goeze 1781).

Phalaena Geometra marginepunctata Goeze, 1781. *Ent. Btr.*, t. III, pars III, pág. 385 (Nürnberg, Baviera, Alemania).

1 ♀

Conocida de las provincias de Almería, Barcelona, Cádiz, Gerona, Granada, Guadalajara, Huesca, Lérida, Logroño, Málaga, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Tarragona, Teruel y Vizcaya.

Vive en el Centro y Sur de Europa, Norte de Africa, El Líbano, Turquía, Irak e Irán.

16. *COSYMBIA PUPILLARIA* (Hb., 1798).

Geometra pupillaria Hübner, 1798. *Samml. eur. Schmett., Geom.*, lám. XIII, fig. 69 (mas) (Dalmacia, Yugoslavia).

1 ♂ que determiné por genitalia.

Ya señalada de las provincias de Alava, Barcelona, Cádiz, Gerona, Granada, Huesca, Málaga, Murcia, Pontevedra, Segovia, Teruel y Vizcaya.

Sur de Europa, Norte de Africa, Asia Menor, Siria, Argelia. También en Suiza y al Sur del Tirol.

17. *PSEUDOTERPSA CORONILLARIA* (Hb., 1817?).

Geometra coronillaria Hübner, 1817? *Samml. eur. Schmett., Geom.*, lám. XCIII, figs. 479-480 (ma.) 481-482 (focm.) (Jibraltar?).

1 ♀ pequeña y muy bonita, que concuerda en el color con la figura típica de *armoraciaria* Ob h., 1916 (*Ét. Léop. Comp.*, t. XII, lámina CCCLXXXII, fig. 3.200), pero carece de la línea ondulada blanca.

Mentada de las provincias de Barcelona, Cádiz, Gerona, Granada, Huesca, La Coruña, Logroño, Murcia, Orense, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Tarragona, Teruel y Vizcaya.

Suroeste de Europa y Siria.

18. *CHLORISSA FAUSTINATA* (Mill., 1868).

Nemoria faustinata Millière, 1868. *Icon. et descrip. chenill. et lépidop. inéd.*, t. II, págs. 436-440, lám. XCVI, figs. 2-8 (Barcelona, España).

1 ♂ y 2 ♀ bastante estropeadas.

Descrita de Barcelona, donde tiene dos generaciones. Vive sobre romero (*Rosmarinus*).

Ha sido citada de las provincias de Barcelona, Cádiz, Granada, Málaga, Murcia y Teruel.

Península Ibérica, Sur de Francia y Siria.

WESTERMANNIIDAE

19. *EARIAS INSULANA* (B., 1833).

Tortrix insulana Boisduval, 1833. *Faun. Madag.*, pág. 121, lámina XVI, fig. 9 (Madagascar).

Dos ejemplares. Plaga del algodón (*Gossypium herbaceum* L.).

Citada de las provincias de Alicante, Almería, Castellón, Murcia, Tarragona y Valencia.

Palco-tropical. Portugal, España, Francia, Sicilia, Creta, El Líbano, Siria, Irak, Egipto, Canarias, Africa tropical, Asia oriental y central y archipiélago malayo.

ARCTIIDAE

20. *EILEMA ALBICOSTA* (Rghfr., 1894).

Lithosia albicosta Rogenhofer, 1894. *Ann. k. k. Natur. Hofmus. Wien.* t. IX, págs. 45-46, lám. I, fig. 3 (Paso de la Lavanda en la Isla de La Palma, Canarias).

Una pareja en muy mal estado.

Nueva para Europa.

El *corutus* del *acdeagus* del andropigio (lám. I, fig. 5) de mi ♂ español es algo menor que el que presentan otros individuos de "Agua

García", Bajamar, La Laguna, La Laguneta, La Punta, Los Silos y Tacoronte, localidades todas de la isla de Tenerife, y mi único ♂ de la isla de La Gomera, pero como otro individuo de la isla de Hierro, tiene dicha pieza de un tamaño intermedio entre el de la Península y los de las otras islas citadas, no doy, de momento, demasiada importancia a la diferencia.

Según mi parecer, *Eilema albicosta* estaba hasta ahora mal situada en el Sistema. A causa de la forma de la valva, y sobre todo por no poseer más que un *cornutus* en el *acdeagus*, debe colocarse en la Sección II de Sterneck (*Zeits. Oest. Ent. Ver. Wien*, t. XXIII, páginas 13-15, 31-36, 46-48, 54-56, 59-63, 69-74, lám. IV, 1938), o sea detrás de *deplana* (Esp.) e *interposita* (Rthsch.) y antes de *unita* (Hb.).

Ya que mi proyectada monografía sobre las *Eilema* españolas quedó abortada cuando ya llevaba bastante tiempo trabajando en ella, al aparecer, en 1938, el trabajo de Sterneck: "*Zur Kenntnis von Lithosia F., und Pelosia Hb.*" antes reseñado, que recogía casi todos mis puntos de vista, quiero aprovechar esta oportunidad para tratar de la posición dentro del género de la muy poco conocida *Eilema ambrosiana* (Draudt, 1933) (Seitz, *Suppl.*, t. II, pág. 274) descrita de La Vid, provincia de Burgos, que como *albicosta*, no fue estudiada por Sterneck en su memoria. El sitio sería entre *pallifrons* y *lutarrella*, a juzgar por la forma de la *fibula* y los tres *cornuti* del *acdeagus* (lám. I, fig. 6).

Con mi indicación de *albicosta* para La Gomera, según un ♂. VIII-1905 (A. Cabrera leg.) queda completa su distribución en las Canarias occidentales; como también la he identificado de Lanzarote, según otro ♂ colectado en la carretera de María, 23-III-1935 (A. Cabrera leg.) sólo faltaría mencionarla de Fuerteventura.

21. UTETHEISA PULCHELLA (L., 1758).

Phalacna Tinea pulchella Linneo, 1758. *Syst. N.*, edit. X, página 534, núm. 238 (Sur de Europa).

Un ejemplar. El señor Buddenbrock me escribió que en octubre de 1961 era comunísima en los alrededores de Huelva. Especie emigrante.

Citada de las provincias de Almería, Barcelona, Cádiz, Cuenca, Granada, Huesca, Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla, Teruel, Valencia y Vizcaya.

Palco-tropical. Difundida en Europa meridional, se encuentra alguna vez en la central y habita asimismo en Madera, Canarias, África, Turquía, Irak, Armenia, Arabia, Asia central, la India y Australia.

NOCTUIDAE

22. EUXOA PSIMMYTHIOSA BOURSIN, 1958.

Euxoa psimmythiosa Boursin, 1958. *Zeit. Wien. Ent. Ges.*, tomo XLIII, págs. 128-133, láms. 4-5 (Huelva, España).

Una pareja.

Debe situarse a continuación de *E. tritici* (L.).

Hasta ahora sólo conocida de Huelva y de Chiclana, en la provincia de Cádiz.

23. AGROTIS GRASLINI ARENOSA Stgr., 1859.

Agrotis arenosa Staudinger, 1859. *Ent. Zeit. Stettin*, t. XX, página 213 (Dunas del océano en Chiclana, Cádiz).

1 ♂ que concuerda bien con ejemplares topotípicos.

Staudinger describió a *arenosa* como buena especie, pero hay que considerarla sólo raza de *graslini* (Rbr., 1848).

Citada de las provincias de Barcelona, Cádiz, Pontevedra y Salamanca. Habría que comprobar si las indicaciones acerca de la presencia de la especie en las dos últimas provincias se refieren a la forma nominotípica.

A. graslini se halla también en el litoral occidental de Francia: *arenosa* habita las dunas frente al océano de la baja Andalucía y asimismo los alrededores de Barcelona, donde la oruga, según Cuni (*Catálogo*, 1874, pág. 85) está escondida en la arena, medio enterrada, al pie del *Aetheorrhiza bulbosa* que crece cerca del mar. Parece que se alimenta también de *Plantago*, *Scabiosa* y *Rumex*.